

Transport van lacterende koeien



Transport van lacterende koeien

Lacterende koeien zijn kwetsbare dieren en moeten met **speciale zorg** worden vervoerd. Lacterende melkkoeien die niet regelmatig worden gemolken, **kunnen ernstige pijn lijden** vanwege de toenemende druk in de uier en het verhoogde risico op het ontwikkelen van mastitis of andere ziekten. Speciale zorg en goede vervoerspraktijken kunnen dit voorkomen.



Als een koe niet meer kan opstaan, bel dan onmiddellijk de dierenarts!

Vorbereiding

1 Onthoud :
in de **eerste week na het afkalven is vervoer verboden.**



2 Als lacterende koeien niet worden vergezeld door hun kalveren, moeten ze **tenminste om de 12 uur worden gemolken.**

3 Als lacterende koeien voor lange reizen worden vervoerd, zorg dan dat de controlepost over **melcfaciliteiten beschikt.**

5 Nog beter! **Zorg voor water en voer tijdens** het melken en zorg ervoor dat de koeien kunnen eten/ drinken voordat ze worden geladen om de reis te hervatten.

4 **Los de koeien altijd rustig** in de melkstal van de controlepost.

Voor lacterende koeien ligt de optimale temperatuur tussen de 5°C en 15°C.

Onder de 5°C hebben koeien extra warmte nodig, vooral als er tocht is en de luchtvochtigheid hoog is. **Niet vervoeren wanneer de temperatuur boven de 30°C is.**